



## Recomendaciones médicas

Especialista	Evaluación para hacerse	Detección y vigilancia
Médico de Atención Primaria	Iniciado referencias a subespecialista, determinar el crecimiento y el desarrollo	Evaluar los parámetros de crecimiento y desarrollo en cada visita.
Clínica de Desarrollo	neurocognitivo (desarrollo) y la evaluación comportamiento	En el momento del diagnóstico, luego anualmente en la infancia.
Atención Temprana	física, y evaluaciones de terapia del habla ocupacionales	Al momento del diagnóstico, a continuación, según sea necesario.
Genetista	Confirmación de diagnóstico y evaluaciones periódicas de seguimiento	En el momento del diagnóstico, luego anualmente.
Audiología	evaluación audiológica rutinaria	En el momento del diagnóstico, a continuación, según sea necesario.
Cardiología	ecocardiograma y electrocardiograma para evaluar en busca de defectos congénitos del corazón y dilatación de la raíz aórtica (agrandamiento de la aorta)el	En momento del diagnóstico. Si es normal, repetir la eco cada 2-3 años. *
Dental	Evaluar para los problemas de esmalte, maloclusión, la pérdida prematura de dientes	Como sea necesario.
Oído nariz y garganta (ENT)	para evaluar las anomalías del paladar	Como necesiten.
Gastroenterología / Alimentación y Nutrición	evaluación que introduce por la falta de prosperar, retraso del crecimiento, reflujo, estreñimiento	Al momento del diagnóstico, a continuación, con la regularidad necesaria.
Neurología	RM cerebral para las malformaciones estructurales y EEG para las convulsiones	Como sea necesario.
Oftalmología	evaluar la presencia de déficit de agudeza visual, estrabismo, fotofobia	Al momento del diagnóstico, a continuación, según sea necesario.
Habla / lenguaje patología	estudio de la función Swallow	Al momento del diagnóstico (si en la infancia).

Estudio del sueño	Este depende de la edad y los síntomas. La mayoría de los niños con LPT no tienen despertares frecuentes, pero una proporción justa tener apnea obstructiva del sueño y o central.	En la edad del niño cooperará
Urología	renal para evaluar Ultrasonido anomalías renales ^	En el momento del diagnóstico
Trabajo Sangre	-CBC -A1c (azúcar en la sangre) -Panel Thyroid y Parathyroid -la vitamina B12 - El nivel de calcio-fosfato - Glóbulos rojos	Anualmente

Copyright © 2012 Julie Smith -Centeno [www.ptlsfoundation.org](http://www.ptlsfoundation.org)

Estos son revisados y recomendados por el Dr. L. Potocki para la Fundación de Extensión LPT, Inc.

\*Estas recomendaciones dependen de la edad en el momento de la evaluación inicial y puede estar sujeta a cambios a medida que aprendemos más sobre la funciones cardíacas de los individuos con LPT.

^ La ecografía renal puede no detectar el reflujo en los riñones; Por lo tanto, una evaluación adicional puede estar justificada.